RESULTAT SONDAGE VST NOUVEAU LEVOTHYROX - PERIODE DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE 2017

Nombre de personnes ayant participé au sondage	450	
Nb personnes déclarant aller mieux ou sans changement	72	16,00%
Nb de personnes ayant déclaré aller moins bien	378	84,00%

Nb de réponses détaillant les symptômes	199	52,65%	%par rapport nb personnes ayant signalé aller moins bien

199 personnes ont accepté de détailler leurs symptômes et **nous les en remercion**s.

Toutes les questions n'ont pas pu donner lieu à exploitation complète , certaines questions n'ayant pas donné lieu à réponse

Le nombre de réponses exploitables figure au regard de chaque tableau

Symptômes — 199 réponses exploitables

fatigue - hypersomnie journée	132	66,33%
insomnie, pb de sommeil	70	35,18%
migraine - maux de tête	68	34,17%
vertiges, étourdissements	65	32,66%
palpitations-tachycardie	46	23,12%
maux ventre-brûlures estomac-pb digestifs	46	23,12%
douleurs musculaires-articulaires	46	23,12%
prise de poids	37	18,59%
pb de concentration-mémoire	36	18,09%
chute de cheveux	35	17,59%
diarrhée	32	16,08%
angoisses-tristesse-anxiété-moral	31	15,58%
irritabilité-énervement-émotivité	31	15,58%
trouble vision - autres pb oculaires	31	15,58%
nausées	30	15,08%
crampes - tremblements	21	10,55%
constipation	19	9,55%
gorge nouée-oppression-difficulté respiratoires	19	9,55%
perte de poids	12	6,03%

% par rapport nb personnes s'étant exprimées

sueurs - bouffées chaleur	12	6,03%
perte appétit	11	5,53%
pb cutanés-urticaire-eczéma	10	5,03%
hausse de tension	7	3,52%
fourmillements	7	3,52%
langue gonflée-chargée-bouche sèche	6	3,02%
chute de tension	6	3,02%
syndrome jambes sans repos	6	3,02%
fringale	4	2,01%
acouphènes - bourdonnements oreilles	4	2,01%
problèmes de règles	4	2,01%
asthme	3	1,51%
problèmes urinaires	3	1,51%
symptômes généraux hypo	3	1,51%
hypoglycémie	2	1,01%
œdème	2	1,01%
autres - signalé 1 seule fois	5	2,51%

(frilosité-hyperacidité-baisse cholestérol-crise hémorroïdes-f. couche)

Ancienneté de prise du Levothyrox — 175 réponses exploitables

< 1 an	15	8,57%
> 1 an et <= 5 ans	58	33,14%
> 5 ans et <= 10 ans	44	25,14%
> 10 ans et <= 15 ans	25	14,29%
> 15 ans et >= 20 ans	16	9,14%
> 20 ans et >= 25 ans	10	5,71%
> 25 ans	7	4,00%

Motif de prise du Lévothyrox — 186 réponses exploitables

Thyroïdectomie quel que soit le motif	108	58,06%
Hashimoto	44	23,66%
Hypothyroïdie	20	10,75%
Basedow	7	3,76%
Lobectomie	4	2,15%
Autres	3	1,61%

Impact sur la TSH — 100 réponses exploitables

TSH en augmentation dont :	68	68,00%		
* augm. < 0,50			17	25,00%
* entre 0,50 et < 1			11	16,18%
* entre 1 et < 2			13	19,12%
* entre 2 et < 5			13	19,12%
* > 5 dont :			14	20,59%
- entre 5 et < 6				
- entre 6 et 10				
- > 10 : (+ 21 et + 44)				
TSH en baisse dont :	29	29,00%		
* diminution < 0,20			5	17,24%
* entre 0,20 et < 0,50			5	17,24%
* entre 0,50 et < 1			5	17,24%
* entre 1 et < 2			8	27,59%
* entre 2 et < 3			2	6,90%
* > 3			4	13,79%
TSH non impactée	3	3,00%		